



เชื้อไวรัส
RSV
ภัยร้ายเด็กเล็ก!



รู้จัก เชื้อไวรัส RSV

- RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus
- มี 2 สายพันธุ์ คือ RSV-A และ RSV-B
- เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็ก
- ระบาดในช่วงหน้าฝน
- มักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่แข็งแรงดีอาการมักไม่รุนแรงและหายได้เอง
- อาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา
แต่เด็กเล็กเชื้ออาจลุกลามทำให้เป็นปอดอักเสบได้

ที่มา : กรมควบคุมโรค,สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

อาการอันตรายเมื่อรับเชื้อ RSV

ไข้สูง

ไม่กิน

ไม่เล่น

เชื่องซึม

หายใจมีเสียงหวีด

หายใจเร็วกว่าปกติ

หยุดหายใจง่าย



หากมีอาการแบบนี้ควรรีบพามาพบแพทย์โดยด่วน!

หลังรับเชื้อ RSV สามารถแสดงอาการได้เร็วที่สุดหลังติดเชื้อ 2 วัน

ช้าที่สุด 8 วัน ส่วนใหญ่เฉลี่ยที่ 4-6 วัน

ที่มา : กรมควบคุมโรค,สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

Thai PBS
NewMedia

วิธีป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส RSV



หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
ทั้งเด็กเล็กและผู้ปกครอง



หลีกเลี่ยงชุมชน
หรือสถานที่แออัด



ทำความสะอาดบ้าน
และของเล่นเป็นประจำ



ผู้ปกครองและคนในบ้าน
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่



รับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ



หากมีเด็กป่วยควรแยกออก
จากเด็กที่ยังไม่ติดเชื้อ
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ