

ระวัง!

โรคไข้มาลาเรีย ชนิดโนโวไซ

(*Plasmodium knowlesi*) หรือ Pk.

เป็นโรคติดต่อจากลิงสู่คน โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ
ซึ่งกัดลิงที่มีเชื้อมาลาเรียชนิดนี้ แล้วยุงมากัดคน

ลิง

ที่เป็นสัตว์รังโรค

ลิงกัง ลิงเสน

ลิงแสม ลิงวอก

ลิงอ้ายเงี้ยว

อาการ



ไข้สูง



ปวดศีรษะ



หนาวสั่น



เหงื่อออกมาก

แต่สามารถป้องกันได้

- **ทายากันยุง** ยาจุดกันยุง หรือสเปรย์ไล่ยุง
- **นอนมุ้ง** แพลนอนน หรือเต็นท์ ที่ปิดมิดชิด
- **มีไข้ หนาวสั่น รีบพบหมอ** เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ได้ที่
 - หน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง (มาลาเรียคลินิก)
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
 - โรงพยาบาล





โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)

เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus โดยเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษ

ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยกว่า 100 รายแล้ว จาก 15 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักรอังกฤษ สเปน โปรตุเกส อิตาลี เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และกรีซ (ยังไม่พบในไทย)

วัคซีนไข้ทรพิษ

ป้องกันได้ \approx 85%

ส่วนใหญ่หาเองได้

อาการรุนแรงมักพบในเด็ก

ติดต่อจากสัตว์สู่คน

จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ จากถูกสัตว์กัดข่วน ทำอาหารจากสัตว์ป่า หรืออาจติดทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วย การแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่เกิดขึ้นได้ โดยอาการของโรค ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโต

ป้องกันตัวเอง

- 1). เลี่ยงการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์
- 2). หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก โดยเฉพาะสัตว์ป่า
- 3). หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อเสี่ยง
- 4). ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง หรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศ
- 5). กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน

หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
และแยกกักเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

