

คาถา 5 ย กั้นสุนัขกัด

ย 1

อย่าเหยียบ
สุนัขให้โมโห



ย 2

อย่าเหยียบหาง, หัว, ตัว, ขา,
หรือทำให้สุนัขตกใจ



ย 3

อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัด
ด้วยมือเปล่า



ย 4

อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้าย
อาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ย 5

อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สุนัข
ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



เมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน ต้องทำดังนี้

1



ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงก้นแผล
ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด

2



จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน
สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3



ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง

สุนัขกัดต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามหมอ

ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

โรคพิษสุนัขบ้า




เลี้ยงสุนัข รักถูกวิธี

“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต โดยเฉพาะพบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือแมว

: สาเหตุการติดต่อ



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่า มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

: อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

• ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

• ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้นหงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก มานตาขยายกว้าง

• ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปากน้ำลายไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ ล้มลงอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

: อาการที่พบในคน


ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ 3 สัปดาห์ – 6 เดือน แต่บางราย มีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรง บริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำปวดท้องน้อยและขากกล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัข


1

นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)



2

ไม่ปล่อยให้สุนัขไปเล่นพาดในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง



3

ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิด ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



“โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้” หากมีอาการแล้ว ตายทุกราย

หยุดปล่อยหมา
หยุดปัญหาหมาจรจัด