



## แนวคิดการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๔

“Hepatitis can’t wait: โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอดไม่ได้”

วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ทุกวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรถึงโรคไวรัสตับอักเสบ ตลอดจนสนับสนุนการป้องกัน ตรวจวินิจฉัย ดูแล และการรักษา ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีแนวคิดรณรงค์ คือ “Hepatitis can’t wait” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ไม่สามารถรอการดำเนินการต่าง ๆ ได้ ต้องดำเนินการทันทีเพื่อกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้

โรคไวรัสตับอักเสบถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศในที่ประชุมสมัชชาองค์กรอนามัยโลก ให้ประเทศไทยสมาชิกดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบอย่างบูรณาการ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว เป็นรูปธรรม จากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทั่วโลก ประมาณ ๒๕๗ ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทั่วโลก ประมาณ ๗๗ ล้านคน และสถานการณ์ในประเทศไทย พบรู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง ประมาณ ๒.๒ – ๓ ล้านคน (ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาว ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ ๔ แสนคน พbmมากในประชาชนอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป และพบอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ข้อมูลจากแนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ประเทศไทย) ซึ่งโรคไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีนในการป้องกัน สามารถรักษาได้แต่ไม่หายขาด ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซี ไม่มีวัคซีนในการป้องกัน แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการทานยาต้านไวรัสให้ครบ ๑๒ สัปดาห์

ปี ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ได้มีมาตรการการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ในส่วนมาตรการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี ได้ดำเนินโครงการนำร่องการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก พร้อมทั้งผลักดันสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการตรวจประเมินโรคไวรัสตับอักเสบบีและการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเน้นการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี สร้างความตระหนักรถึงการป้องกันตนเอง และหากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้เข้ารับการคัดกรอง และเข้าสู่ระบบบริการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ภาวะตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ซึ่งประเด็นสื่อสาร ในปี ๒๕๖๔ คือ “Hepatitis can’t wait : โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอดไม่ได้”

### ไวรัสตับอักเสบบี : มีวัคซีนในการป้องกัน สามารถรักษาได้แต่ไม่หายขาด

การสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรถึงโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้กับประชาชน ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง ถ้าหากมีพฤติกรรมเสี่ยง ให้เข้าสู่ระบบบริการตรวจคัดกรอง โรคไวรัสตับอักเสบบี โดยเร็ว และที่สำคัญโรคไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีนในการป้องกันโรค สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ความมาฝากครรภ์โดยเร็ว (อายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์) และต้องได้รับการตรวจหาโรคไวรัสตับอักเสบบีทุกราย เพื่อให้แพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ทำให้สามารถลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการบรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในแผนการสร้างเสริม





ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ทำให้เด็กแรกเกิดทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แต่สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี หากไม่มีภูมิคุ้มกันแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ครบชุด จำนวน ๓ เข็ม ทั้งนี้ หากประชาชนรู้ความเสี่ยงของตนเอง เข้าสู่ระบบบริการคัดกรองโดยเร็ว และรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี จะทำให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี รายใหม่ได้

**ไวรัสตับอักเสบซี : ไม่มีวัคซีนในการป้องกัน แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการทานยาต้านไวรัสให้ครบ ๑๒ สัปดาห์**

โรคไวรัสตับอักเสบซี ไม่มีวัคซีนในการป้องกัน แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการทานยาต้านไวรัส หากมีความเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็ว ซึ่งรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี ที่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ เพียงรับประทานยาต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนการตรวจคัดกรองและการรักษา โรคไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้ใช้สารเสพติดโดยวิธีฉีด ฟรี ซึ่งประชาชนที่มีความเสี่ยง ประเมินตนเองแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ให้เข้ารับบริการตรวจคัดกรอง และรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ ลดการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอันเนื่องมาจากการไวรัสตับอักเสบซีได้

เนื่องในการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ปี ๒๕๖๔ (๒๘ กรกฎาคมของทุกปี) นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพ และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์ภายใต้แนวคิด

**“Hepatitis can’t wait : โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้”**

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบมากเพิ่มขึ้น ความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในปัจจุบัน ทั่วโลกจึงร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ตระหนักรู้ไม่สามารถทำการดำเนินการต่าง ๆ ได้ ทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงและอาจเป็นโรคไวรัสตับอักเสบโดยไม่รู้สึกอาการติดเชื้อของตนเอง ไม่สามารถทำการตรวจได้ ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบไม่สามารถทำการรักษาเพื่อช่วยรักษาชีวิตได้ สรุติสั่งครรภ์ไม่สามารถกระทำการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบได้ หากเกิดไม่สามารถกระทำการฉีดวัคซีนขณะแรกเกิดได้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสตับอักเสบ ไม่สามารถรอด้วยการฉีดราและเดือดภูบดีได้ องค์กรชุมชนไม่สามารถกระลงทุนที่มากขึ้น รวมถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจต้องดำเนินการต่าง ๆ โดยทุกกลุ่ม ทุกองค์กรต้องร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ประเมินความเสี่ยงของตนเองและคนรอบข้างได้ หากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้ารับบริการตรวจคัดกรอง และการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีโดยเร็ว นำไปสู่การกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้หมดไป ภายในปี ๒๕๗๓

กรมควบคุมโรค ได้จัดทำข้อมูลและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic, VDO Clip และ Banner สนับสนุนแก่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ดังนี้

ดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

<https://ddc.moph.go.th/das>

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ได้ทาง Facebook Fan page: กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์





กรมควบคุมโรค  
Ministry of Public Health

# “ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

## อาการ มี 2 ระดับ



### 1. ระดับอ่อนเพลีย

- มีอาการภายใน 2 - 5 เดือน
- ไข้, ตัวเหลือง, ตาเหลือง
- ร่างกายอ่อนเพลีย
- ปวดท้องได้ขยายต้องหัว
- คลื่นไส้ อาเจียน
- เชื่อลิบตุกกำลังอาจทำให้เกิดภาวะตืบ瓦อได้



(หากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์เป็นตู้มือจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เมืองพิงค์)

### 2. ระดับรุนแรง

- ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไปร่างกาย ส่วนใหญ่ไปมีอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้



(หากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์เป็นตู้มือจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ และเสบประสาด)

### ติดต่อ ทางใด ?

### ไม่ติดต่อ ทางใด ?



เด็กหรือสารคัดหลัง



แม่ลูกพี่น้อง



ติดต่อจากแม่สู่ลูก



อาหารหรือน้ำดื่ม



แพทย์ผู้รักษา



การสูบ (บุหรี่และยาสูบ)



อาหารใจ



### การป้องกัน

#### วิธีการป้องกันไวรัสตับอักเสบ B

- เด็กแรกเกิดและภาระต่ำต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ให้ครบ
- สำหรับผู้ใหญ่ หากต้องการฉีดวัคซีน ควรได้รับการตรวจเบื้องต้นว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ เพาะเชื้อที่เคยติดเชื้อนามบ้าหรือมีภูมิคุ้มกันทางแล้ว ในเชิงเป็นต้องฉีดวัคซีน
- อยู่ติดต่อใกล้ชิด ให้รับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg) พร้อมๆ กับการฉีดวัคซีน



### การรักษา

#### รักษาได้ แต่ไม่หายขาด

- ยาต้านไวรัสตับอักเสบ การรักษาต้องมีการติดต่อและประเมินผล
- ควรได้รับคำแนะนำในการรักษาและการติดตามอย่างต่อเนื่อง มากที่สุดในการรักษาอยู่ในทุกสิ่งที่เป็นไปได้ รักษาให้พร้อม ตามสิ่งที่





กรมควบคุมโรค  
Ministry of Public Health

# “รักษาได้ หายขาด”

สาธารณรัฐไทยให้หายขาดได้ด้วยการกินยาต้านไวรัส 12 สัปดาห์

## อาการ บี 2 ระยะ

1. ระยะอ่อนเพลิน



## ตรวจพบริวนานไวรัสตับอักเสบ ซี

ไม่เลือด และมา Anti - HCV

เปลี่ยนจากเหลืองเป็นเหลือง



2. ระยะเรื้อรัง



การทำงานของตับมีการอักเสบ  
**มากกว่า 6 เดือน**

และตรวจพบริเวณไขกระดูกและเสือ

ติดต่อ ทางไร?



เลือดหรือ  
สารตัวตัวหลัง



เพศสัมพันธ์



การใช้เข็ม  
เครื่องเข้าร่วมกัน



อาหารหรือ  
้ำดื่ม



แบบให้營ลูก



การสูบ  
(ในบ้านและนอกบ้าน)



อาหารใจ

ไม่ติดต่อ ทางไร?



การรักษา



การรักษา



หากเป็นพุทธิกรรมเรื่อง  
ควรตรวจสอบตัวเอง  
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี



หากใช้ในการรักษาบางชนิด  
อยู่ในชุดสังกัดประเทศไทย  
รักษาได้พร้อม สามารถรับรู้



หากพบว่าติดเชื้อ  
ควรปรึกษาแพทย์  
เพื่อเข้ารับการรักษา



การรักษาในปัจจุบัน  
ใช้ระยะเวลาเพียง  
12 สัปดาห์



การป้องกัน



ไม่ใช้เข็มฉีดยา  
ร่วมกับผู้อื่น



ใช้ถุงยางอนามัย  
ทุกครั้งที่มี  
เพศสัมพันธ์

ปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ไม่ใช่เชื้อป้องกัน จึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกอย่าง



<https://ddc.moph.go.th/das/>



กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัคทีฟ กองทัคทางอากาศ กองทัคบินชีวิตรักษาสุขภาพ



สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422